

# Radivit-D™

Cholecalciferol USP

## Composition:

**Radivit-D™ 2000 IU Tablet:** Each film coated tablet contains Vitamin D<sub>3</sub> as Cholecalciferol USP 2000 IU.

**Radivit-D™ 20000 IU Capsule:** Each capsule contains Vitamin D<sub>3</sub> as Cholecalciferol USP 20000 IU.

**Radivit-D™ 40000 IU Capsule:** Each capsule contains Vitamin D<sub>3</sub> as Cholecalciferol USP 40000 IU.

**Radivit-D™ 50000 IU Capsule:** Each capsule contains Vitamin D<sub>3</sub> as Cholecalciferol USP 50000 IU.

## Pharmacology:

Vitamin D metabolites promote the active absorption of calcium and phosphorus by the small intestine, thus elevating serum calcium and phosphate levels sufficiently to permit bone mineralization. It is also necessary for utilization of both Calcium and Phosphorus. Vitamin D acts as a hormone and increases reabsorption of Calcium and Phosphorus by the kidneys and increased bone turnover.

## Indications:

Prevention and treatment of Vitamin D deficiency states.

## Dosage and administration:

### Adult:

Treatment of Vitamin D Deficiency:  
50000 IU per week for 6 weeks, followed by maintenance therapy (800-2000 IU/day).  
40000 IU per week for 7 weeks, followed by maintenance therapy (800-2000 IU/day).  
Follow-up 25(OH)D measurements in blood should be made approximately 3 to 4 months after initiating maintenance therapy to confirm that the target level has been achieved.  
Prevention of Vitamin D deficiency: 20000 IU/Month.

### Children:

Treatment of Vitamin D deficiency (12-18 years):  
20000IU once every 2 weeks for 6 weeks.  
Prevention of Vitamin D deficiency (12-18 years):  
20000IU once every 6 weeks.

### Route of administration:

Should be swallowed by mouth with plenty of water.

## Contraindications:

Hypersensitivity to any of the components, hypercalcaemia resulting from overdose of Vitamin D, hyperparathyroidism, bone metastases, severe renal insufficiency, severe hypercalciuria, renal calculi etc.

## Warnings & Precaution:

In presence of mild hypercalciuria, careful monitoring with reduction of dose may be needed. Plasma and serum Calcium level should be monitored in mild to moderate renal impairment and also in case of long term use. Patients with renal stone or with such previous, history should also take precaution. Cholecalciferol may increase the risk of digitalis toxicity (arrhythmia). Cholecalciferol should also be prescribed with caution in patients with sarcoidosis.

## Side effects:

### Common:

Hypercalcemia due to prolong use has been commonly reported.

## Rare:

Flatulence, diarrhea, constipation, upper GI discomfort etc. are rare manifestation.

## Use in Pregnancy & Lactation:

### Pregnancy:

There is no evidence to suggest that vitamin D is teratogenic in humans even at very high doses. cholecalciferol should be used during pregnancy only if the benefits outweigh the potential risk to the fetus.

### Lactation:

It should be assumed that exogenous cholecalciferol passes into the breast milk. In view of the potential for hypercalcemia in the mother and for adverse reactions from cholecalciferol in nursing infants, mothers may breastfeed while taking cholecalciferol, provided that the serum Calcium levels of the mother and infant are monitored.

## Use in children and adolescents:

Cholecalciferol capsule or tablet should not be given children under the age of 12.

## Drug Interactions:

### With Medicine:

Cholecalciferol is known to interact with Carbamazepine, Dactinomycin, Diuretics, Fosphenytoin, Miconazole, Phenobarbital, Phenytoin, Primidone.

### With Food & Others:

Mineral oil containing foods interferes with the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamin D preparations.

## Overdose:

At high doses it may result in nausea, vomiting, dizziness, anorexia, abdominal cramps, headache, constipation etc. Treatment includes cessation of therapy and adequate rehydration.

## Storage:

Do not store above 30°C, protect from light & moisture.

Keep out of reach of children.

## Packing:

**Radivit-D™ 2000 IU Tablet:** Each box contains 30 (3 x 10) Tablet in Alu-Alu blister pack.

**Radivit-D™ 20000 IU Capsule:** Each box contains 12 (2 x 6) Capsule in Alu-Alu blister pack.

**Radivit-D™ 40000 IU Capsule:** Each box contains 12 (2 x 6) Capsule in Alu-Alu blister pack.

**Radivit-D™ 50000 IU Capsule:** Each box contains 12 (2 x 6) Capsule in Alu-Alu blister pack.

TM = Trade Mark

**RADIANT**  
PHARMACEUTICALS  
Manufactured by

**Radiant Pharmaceuticals Limited**  
B-34 & B-46, BSCIC Industrial Estate  
Tongi, Gazipur-1710, Bangladesh

PMR 5432 Version: 03

# রেডিভিট-ডি™

কোলিক্যালসিফেরল ইউএসপি

## উপাদানঃ

রেডিভিট-ডি™ ২০০০ আইইউ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ডিটামিন-ডিঃ যা কোলিক্যালসিফেরল ইউএসপি ২০০০ আইইউ হিসেবে আছে।

রেডিভিট-ডি™ ২০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে ডিটামিন-ডিঃ যা কোলিক্যালসিফেরল ইউএসপি ২০০০ আইইউ হিসেবে আছে।

রেডিভিট-ডি™ ৪০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে ডিটামিন-ডিঃ যা কোলিক্যালসিফেরল ইউএসপি ৪০০০ আইইউ হিসেবে আছে।

রেডিভিট-ডি™ ৫০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে ডিটামিন-ডিঃ যা কোলিক্যালসিফেরল ইউএসপি ৫০০০ আইইউ হিসেবে আছে।

## ফার্মাকোলজিঃ

ডিটামিন-ডি ক্ষুদ্রান্তর মাধ্যমে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সক্রিয় শোষণকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বোন মিনারালাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এছাড়াও ইহা শরীরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ডিটামিন-ডি একটি হরমোন হিসেবে কাজ করে এবং কিডনিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পুনঃশোষণকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে হাড় গঠনে ভূমিকা রাখে।

## নির্দেশনাঃ

ডিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগ সমূহের প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত।

## মাত্রা ও সেবনবিধিঃ

### প্রাপ্তবয়স্কঃ

ডিটামিন-ডি এর ঘাটতি জনিত চিকিৎসায়ঃ  
৫০০০ আইইউ প্রতি সপ্তাহে ১ টি করে ৬ সপ্তাহ, তারপর মেইনটেনেন্স ডোজ হিসেবে (প্রতিদিন ৮০০-২০০০ আইইউ) সেবন করতে হবে।

৪০০০ আইইউ প্রতি সপ্তাহে ১ টি করে ৭ সপ্তাহ, তারপর মেইনটেনেন্স ডোজ হিসেবে (প্রতিদিন ৮০০-২০০০ আইইউ) সেবন করতে হবে।

রক্তে ডিটামিন-ডি সঠিক মাত্রায় উপনীত হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য মেইনটেনেন্স ডোজ শুরু করার অন্ততঃ ৩-৪ মাস পর রক্তে ডিটামিন-ডি এর পরিমাণ পরিমাপ করা উচিত।

ডিটামিন-ডি এর ঘাটতি প্রতিরোধকরণেঃ ২০০০ আইইউ প্রতিমাসে একটি করে।

### শিশুদের ক্ষেত্রেঃ

ডিটামিন-ডি এর ঘাটতি জনিত চিকিৎসায়ঃ ২০০০ আইইউ ক্যাপসুল প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ৬ সপ্তাহ।

ডিটামিন-ডি এর ঘাটতি প্রতিরোধকরণেঃ ২০০০ আইইউ প্রতি ৬ সপ্তাহে একটি করে।

### সেবনের উপায়ঃ

পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির সাথে মুখে খেতে হবে।

## প্রতিনির্দেশনাঃ

ওষুধটির প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, ডিটামিন-ডি এর অতিমাত্রায় সেবনে স্ট্রুট হাইপারক্যালসিমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, বোন মেটাষ্ট্যাসিস, তীব্র কিডনিতে সমস্যা, তীব্র হাইপারক্যালসিমিউরিয়া, কিডনিতে পাথর ইত্যাদি।

## সতর্কতা ও পূর্বসতর্কতাঃ

মৃদু হাইপারক্যালসিমিউরিয়ায় নিঃসরণ মাত্রা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মৃদু থেকে মাঝারি মূত্র হ্রাস ও দীর্ঘদিন ব্যবহারে প্লাজমা এবং সিরাম এ ক্যালসিয়াম এর মাত্রা পরিমাপ করতে হবে। যে সকল রোগীর ক্ষেত্রে কিডনির পাথর সৃষ্টির ইতিহাস আছে সেসব ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কোলিক্যালসিফেরল ডিজিটালিস বিষক্রিয়ার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সারকোয়ডোসিস রোগীদের ক্ষেত্রে কোলিক্যালসিফেরল সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

## পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াঃ

### সাধারণঃ

দীর্ঘদিন ব্যবহারে ফলে হাইপার ক্যালসেমিয়া হতে পারে।

### বিরলঃ

বিরলক্ষেত্রে পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাকস্থলীর উপরের অংশে অস্বস্তি হতে পারে।

## গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারঃ

### গর্ভাবস্থায়ঃ

ডিটামিন-ডি উচ্চমাত্রায় সেবনের পরও কোন ধরণের টেরাটোজেনিক ক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এটি গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি টেরাটোজেনিসিটির চেয়ে কোলিক্যালসিফেরলের উপকারিতা বেশি হয়, তাহলে কোলিক্যালসিফেরল সেবন করা যেতে পারে।

### স্তন্যদানকালেঃ

ধারণা করা হয় কোলিক্যালসিফেরল মাতৃদুগ্ধের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়। যদি মায়ের শরীরে হাইপারক্যালসেমিয়ার কারণে শিশুর কোলিক্যালসিফেরলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহলে মা ও শিশুর রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপ করা উচিত।

## শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ

কোলিক্যালসিফেরল ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট ১২ বছরের কম বয়সের শিশুকে দেয়া যাবে না।

## আন্তঃওষুধ ক্রিয়াঃ

### ওষুধের সাথে ক্রিয়াঃ

কোলিক্যালসিফেরল কারবামাজেপাইন, ড্যাকটিনোমাইসিন, ডাইইউরেটিকস, ফসফিনাইটোইন, মাইকোনাজল, ফেনোবারবিটাল, ফিনাইটোইন, প্রাইমিডোন এর সাথে বিক্রিয়া করে।

### খাবার ও অন্যান্য উপাদানের সাথে ক্রিয়াঃ

মিনারেল ওয়েল যুক্ত খাবার সমূহের সাথে তেল বা চর্বিতে দ্রবীভূত অন্যান্য ডিটামিনের মত ডিটামিন-ডি ও তেল বা চর্বিযুক্ত খাবারের সাথে ক্রিয়া করে থাকে।

## অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনঃ

অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনে বমি বমি ভাব, বমি, ঝিমুনি, ক্ষুধামন্দা, পেট কামড়ানো, মাথা ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি হতে পারে। চিকিৎসা হিসাবে সেবন বন্ধ এবং অতিমাত্রায় তরল গ্রহণ করতে হবে।

## সংরক্ষণঃ

৩০°C তাপমাত্রার উপরে সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকুন, আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## সরবরাহঃ

রেডিভিট-ডি™ ২০০০ আইইউ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩০ (৩ x ১০) টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

রেডিভিট-ডি™ ২০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১২ (২ x ৬) টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

রেডিভিট-ডি™ ৪০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১২ (২ x ৬) টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

রেডিভিট-ডি™ ৫০০০ আইইউ ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১২ (২ x ৬) টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইংরেজী অংশ দেখুন।

TM = ট্রেডমার্ক

RADIANT  
PHARMACEUTICALS

## প্রস্তুতকারক

রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বি-৩৪ ও বি-৪৬, বিসিক শিল্প এলাকা

টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১০, বাংলাদেশ